

VIRUELA DEL MONO

Transmisión, síntomas y tratamientos



EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL

Rápido crecimiento de los casos
1 positivo contagia a 1,8 personas



- Enfermedad infecciosa descubierta en 1958
- Periodo de incubación **7 DÍAS (de 3 a 20)**
- Periodo de curación **2-4 SEMANAS**
- La mayoría de los casos son leves

SÍNTOMAS

- Erupción cutánea*
- Dolor perianal
- Llagas bucales
- Amigdalitis con dolor

*Puede ser una úlcera única

Antes de la erupción pueden darse fiebre, mialgia, dolor de cabeza, malestar, cansancio y adenopatías.

RECOMENDACIONES DE LA OMS

- Mejorar diagnóstico, rastreo y seguimiento de casos
- Adopción de medidas de salud pública sin estigmatizar a ningún colectivo
- Proteger a las personas vulnerables
- Reducir el número de parejas sexuales

TRATAMIENTOS

ANTIVIRALES



VACUNACIÓN

Las personas con más factores de riesgo o contactos estrechos deben contactar con los profesionales sanitarios de referencia.

VÍAS DE TRANSMISIÓN

El contagio se produce desde el inicio del exantema hasta la curación de las lesiones (aparición de nueva capa de piel)

- Contacto físico estrecho con el infectado o fluidos corporales
- Saliva

- Gotitas respiratorias grandes
- Ropa y otras superficies u objetos

No es una infección de transmisión sexual en el sentido tradicional, aunque se puede adquirir por contacto físico cercano. La posibilidad de vía de transmisión sexual está en estudio.

Datos a 1 de agosto de 2022

