

VACUNAS A UTILIZAR ACTUALMENTE

ARN Mensajero

COMIRNATY 30 µg (Pfizer) (≥ 12 años edad) intervalo 21 días (mínimo 19 días)
COMIRNATY 10 µg (Pfizer) (5-11 años edad) intervalo 8 semanas.
SPIKEVAX (Moderna) (≥ 6 años edad) intervalo 28 días (mínimo 25 días). Dosis de **0,50 ml** o dosis de **0,25 ml**



Subunidad proteica

NUVAXOVID (Novavax) (≥ 18 años edad) intervalo 3 semanas (mínimo 14 días).
 Para personas con contraindicación a otras vacunas



POBLACIÓN DE MUY ALTO RIESGO GRUPO 7 E IMUNOSUPRESIÓN

PRIMOVACUNACIÓN: 2 DOSIS + DOSIS ADICIONAL

- Población 5-11 años: 2 dosis **COMIRNATY 10 µg** + 1 dosis adicional COMIRNATY 10 µg, a las 8 semanas tras la 2ª dosis
- Población ≥ 12 años: 2 dosis **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)** + 1 dosis adicional **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)** / **NUVAXOVID** intervalo mínimo 28 días desde la última dosis independientemente de si han pasado la infección

DOSIS DE RECUERDO (4ª dosis)

Población ≥ 12 años: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)*** / **NUVAXOVID**
 → 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mínimo 4 semanas)

CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN

- Población 5-11 años
 - ▶ Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis: **COMIRNATY 10 µg**
 → Pauta estándar 2 dosis. La 2ª dosis se administrará a las 8 semanas desde la 1ª dosis
- Población ≥ 12 años
 - ▶ Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)**
 → Pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de infección e intervalo entre dosis
 - ▶ Infección después de la primovacuna: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)*** / **NUVAXOVID**
 → 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde la última dosis independientemente de la fecha de infección

*En personas que no recibieron la dosis adicional, la dosis de SPIKEVAX será de 0,5ml

Población general infantil de 5-11 años

PRIMOVACUNACIÓN:
COMIRNATY 10 µg
 → 2 dosis

CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:

- Infección antes de 1ª dosis → dosis única a las 8 semanas de la infección
- Infección entre 1ª y 2ª dosis → completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección

Población general de 12-65 años

PRIMOVACUNACIÓN:

COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,50ml)** → 2 dosis
JANSSEN ≥ 18 años de edad → dosis única
VAXZEVRIA homóloga o heteróloga Vaxzevria-Comirnaty (≥ 18 años):
 → 2 dosis intervalo 12 semanas (mín. 21 d)
NUVAXOVID (0,5ml), población ≥ 18 años que → 2 dosis ó 1 dosis (completar la pauta)

DOSIS DE RECUERDO:

- ≥ 18 años con primovacuna ARNm o heteróloga VAXZEVRIA
COMIRNATY: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mín. 4 semanas)
- ≥ 18 años con primovacuna homóloga VAXZEVRIA o pauta JANSSEN:
COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 3 meses desde la dosis anterior (mín. 4 semanas).

CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:

- Infección antes de 1ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)**
 → dosis única a las 4 semanas de la infección.
- Infección entre 1ª y 2ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,50ml)**
 → completar 2ª dosis a las 4 semanas de la infección
- Infección después de 2ª dosis: **COMIRNATY 30 µg** / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas)

Población >65 años, residentes centros de mayores y grandes dependientes

PRIMOVACUNACIÓN:

COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,50 ml)** → 2 dosis

DOSIS DE RECUERDO:

COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior.

CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN:

- Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis:
COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,50ml)** → pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de la infección y garantizando el intervalo aconsejado entre dosis
- Infección después de 2ª dosis:
COMIRNATY 30 µg / **SPIKEVAX (0,25 ml)** / **NUVAXOVID** → 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde la administración de la última dosis



QR de la Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario
 Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 27/05/2022

