


## Anexo 1.


### CÓMO USAR DIAZEPAM SOLUCIÓN RECTAL

Para garantizar la correcta administración de diazepam solución rectal se seguirán las normas para la correcta administración del fabricante. Dado que la marca comercial generalizada en España es STESOLID®, a continuación se exponen las NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE STESOLID.


#### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE STESOLID®**



1. Para abrir, girar cuidadosamente la lengüeta 2 ó 3 veces, sin tirar de ella, hasta separación de la misma.



2. Colocar al paciente boca abajo o tendido de lado con un cojín bajo la cadera. En el caso de niños pequeños se pueden colocar encima de las rodillas de la persona que va a administrar el envase unidosis.




3. Insertar la cánula en el ano. En niños menores de 3 años insertar solamente hasta la primera marca de la cánula.




4. Mantener siempre el envase unidosis inclinado y con la cánula hacia abajo durante la administración.



5. Mantener el envase unidosis en esta posición. Nota: no presionarlo hasta que esté bien insertado.



6. Cuando el envase unidosis se halle insertado, vaciarlo mediante presión de los dedos índice y pulgar.



7. Retirar la cánula manteniendo presionado el envase unidosis. Mantener las nalgas del paciente apretadas durante unos momentos para evitar una posible pérdida de líquido.



8. La pequeña cantidad de líquido que queda en el envase unidosis no afecta a la dosis correcta.